



Boletín

Sanitario Avícola

Enero 2026

Edición

67

INFLUENZA AVIAR EN COLOMBIA, CONTEXTO GLOBAL NACIONAL, Y SITUACIÓN SANITARIA DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE NOTIFICABLE


El Programa Técnico de **Fenavi - FONAV** presenta el boletín sanitario avícola, construido a partir de los reportes oficiales del Boletín Epidemiológico del ICA, el Portal de la Organización Mundial de Sanidad Animal OMSA y los avances en los temas normativos sobre las enfermedades de control oficial. Su contenido informa la actualidad de Influenza Aviar en Colombia y el mundo, así como la situación sanitaria para la Enfermedad de Newcastle Notificable.

En esta edición

- ✓ Actualización de IAAP en las Américas
- ✓ Actualización de IAAP en Colombia
- ✓ Actualización de IAAP en el mundo
- ✓ Actualización de Enfermedad de Newcastle Notificable en Colombia y en el Mundo

Influenza aviar en las Américas

Focos IAAP reportados en Estados Unidos – Enero 2026



AVES COMERCIALES - USA		
Estado	Aves afectadas	Granjas positivas
Kansas	401.180	4
Minnesota	383.400	4
Indiana	27.500	3
North Carolina	34.200	2
Georgia	87.400	2
Iowa	32.100	2
Pennsylvania	1.511.200	2
Colorado	1.332.760	2
California	34.600	1
Arkansas	620	1
Missouri	8.300	1
Delaware	147.900	1
New Jersey	3.900	1
Montana	230	1
Maryland	37.300	1

Fuente: USDA

AVES TRASPATIO - USA		
Estado	Aves afectadas	Predios positivos
Nebraska	380	2
Arkansas	20	2
New York	560	3
Oregón	70	2
Illinois	80	2
California	160	2
Colorado	40	2
Pennsylvania	2740	3
Washington	40	2
West Virginia	60	2
Massachusetts	340	1
Missouri	10	1
North Carolina	10	1
North Dakota	20	1
Wyoming	30	1
Kansas	70	1
Texas	20	1
Oklahoma	50	1
Kentucky	120	1
Michigan	50	1
Montana	20	1

Fuente: USDA

Influenza aviar en las Américas

Focos IAAP reportados en Estados Unidos – Enero 2026

AVES SILVESTRES - USA					
Familia Taxonómica	Especies Afectadas	N° de Casos/ aves afectadas	N° Estados Afectados	Subtipo H5	Subtipo H5N1
Anatidae	<i>Anas rubripes</i> <i>Mareca americana</i> <i>Spatula discors</i> <i>Bucephala albeola</i> <i>Branta hutchinsii</i> <i>Branta canadensis</i> <i>Aythya valisineria</i> <i>Bucephala clangula</i> <i>Mareca strepera</i> <i>Anser anser</i> <i>Anser albifrons</i> <i>Anas carolinensis</i> <i>Lophodytes cucullatus</i> <i>Aythya affinis</i> <i>Anas platyrhynchos</i> <i>Cairina moschata</i> <i>Cygnus olor</i> <i>Anas acuta</i> <i>Spatula clypeata</i> <i>Aythya americana</i> <i>Aythya collaris</i> <i>Anser rossii</i> <i>Anser caerulescens</i> <i>Cygnus buccinator</i> <i>Aix sponsa</i>	419	34	302	117
Accipitridae	<i>Haliaeetus leucocephalus</i> <i>Astur cooperii</i> <i>Buteo jamaicensis</i>	47	16	31	16
Strigidae	<i>Strix varia</i> <i>Bubo virginianus</i>	22	10	8	14
Laridae	<i>Larus hyperboreus</i> <i>Larus glaucescens</i> <i>Larus marinus</i> <i>Leucophaeus atricilla</i> <i>Larus occidentalis</i>	13	3	3	10
Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i> <i>Cathartes aura</i>	11	6	5	6
Corvidae	<i>Pica hudsonia</i> <i>Corvus corax</i> <i>Corvus ossifragus</i>	6	5	5	1
Corvididae	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	6	4	4	2
Scolopacidae	<i>Arenaria melanocephala</i> <i>Calidris alba</i> <i>Tringa semipalmata</i>	4	1	1	3
Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i>	3	1	0	3
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	1	1	1	0
Pelecanidae	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>	1	1	1	0
Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	1	1	1	0
Psittacidae	<i>Psittacus erithacus</i>	1	1	0	1
Rynchopidae	<i>Rynchops niger</i>	1	1	1	0

Fuente: USDA



Influenza aviar en Suramérica

Algunos países de Suramérica se han visto afectados por la aparición de influenza Aviar de Alta Patogenicidad tanto en el sector avícola como en otras especies aviares durante la Vigencia 2025, sin embargo, durante el mes de enero del año 2026 no se han reportado casos asociados a IAAP en la región sur del continente, dentro de las medidas de respuesta para cada país se ha optado por extremar medidas de bioseguridad internas y reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Fuente: FAO, OMSA

Influenza aviar en Mamíferos domésticos

Durante los últimos años, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ha reportado un incremento en los casos de influenza aviar (H5N1) detectados en mamíferos. A comienzos del año 2024 se notificaron, por primera vez, infecciones causadas por virus de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en bovinos enfermos provenientes de explotaciones lecheras en Kansas, Michigan y Texas.

Esto sumado a el continuo reporte de casos similares que se han presentado desde entonces, en enero de 2026, se registraron dos casos de influenza aviar tipo A (H5N1) en mamíferos domésticos: dos gatos ubicados en Estados Unidos en el estado de Illinois y Washington.

De forma similar, en diciembre de 2025, las autoridades sanitarias de países bajos reportaron dos gatos domésticos enfermos, uno de ellos positivos a influenza aviar H5N1, el cual falleció dos días después. Durante la investigación epidemiológica que adelantaron, se determinó que uno de los gatos procedía de una granja lechera ubicada en la provincia de Frisia. A partir de este hallazgo en enero de 2026, se realizaron pruebas en el ganado bovino de esta explotación, donde se detectaron anticuerpos contra IAAP H5N1 en una vaca del rebaño. Sin embargo, hasta el momento no se han identificado animales positivos a la enfermedad ni indicios de circulación activa del virus en la granja, por lo que se mantienen las investigaciones; estos casos sugieren que en esta explotación lechera hubo exposición previa al virus de influenza aviar tipo A (H5N1).

Recuerde la importancia de mantener una estricta vigilancia frente al ingreso de aves silvestres en las granjas y se sugiere se mantenga controlado el contacto entre animales domésticos y el ganado manteniendo medidas de bioseguridad en estricto cumplimiento y aplicación de tal manera que se reduzca el riesgo de aparición de la enfermedad tanto en mamíferos domésticos como en humanos.

Fuente: USDA, ECDC, Government of the Netherlands

Consulta más información




HAZ CLICK




Notificaciones de cuadros compatibles con enfermedades de control oficial en Colombia 2026

Durante el mes de enero se recibieron notificaciones provenientes de producciones de traspatio en varias regiones del país, donde se atendió la sospecha de cuadros de enfermedad que pudieran compatibles con enfermedades de control oficial, se reportaron 22 notificaciones **por sospecha de enfermedad de control oficial**, provenientes de aves traspatio (20), aves silvestres (1), granjas comerciales (1) de las cuales en postura encontramos (1), engorde (0), reproductoras (0). De la totalidad de las notificaciones se han obtenido resultados negativos para las diferentes enfermedades de control oficial.



Fuente: ICA



De acuerdo con la tendencia estacional de incidencia de IAAP en aves de corral, según OMSA desde agosto inicio la temporada donde el riesgo aumenta en el hemisferio sur relacionado a la dinámica migratoria de la región continental

De acuerdo con la OMSA, Colombia erradicó exitosamente los brotes de IAAP (H5N1) que se detectaron durante mes de diciembre del año 2025, por medio de la implementación de medidas de limpieza y desinfección, vigilancia epidemiológica y control sanitario en las zonas afectadas, se logró la contención de los brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) recalando que, durante la emergencia, Colombia no perdió el estatus sanitario como país Libre de IAAP.

Una vez erradicados todos los brotes y realizadas las visitas de monitoreo con hallazgos satisfactorios, así como finalizada la vigilancia activa en las zonas afectadas, la emergencia sanitaria declarada por esta enfermedad se dio por concluida el día 02 de febrero de 2026 ante la OMSA.



.....
**Colombia mantiene su
estatus sanitario de
país libre de IAAP**

Se recuerda la importancia de mantener elevadas las medidas de bioseguridad y protección personal incluso ante la ausencia de casos positivos en el país. Cuando se enfrente a la atención o manipulación de aves sospechosas de enfermedad Notificable, utilice de forma adecuada y eficiente los Elementos de Protección Personal (EPP) y replique estas buenas prácticas con las personas del entorno para proyectar un ambiente seguro

Bioseguridad y prevención ante IAAP

Compartimos piezas gráficas Realizadas por FENAVI - FONAV dentro de la estrategia de prevención para IAAP



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



Señor productor proteja a sus aves, evite la llegada de enfermedades a su predio

NO baje la guardia

y minimice los riesgos que representa para la salud de las aves domésticas, el paso de las aves silvestres migratorias por el territorio nacional, las cuales suelen ser portadoras sanas de enfermedades.

Implemente todas las **medidas de bioseguridad:**

- ✓ Disponga de un **lugar limpio y cerrado para alojar a sus aves**, impidiendo su contacto con aves silvestres.



- ✓ **Limite la tenencia de otras especies** animales en el mismo predio.

- ✓ Ubique el **alimento** de sus aves en un **sitio limpio, seco, cerrado y ventilado**, evitando su desperdicio.



- ✓ Si observa la formación de **charcos u otros estancamientos de agua** que puedan atraer aves silvestres o ser posibles reservorios de enfermedades, **rellénelos** empleando materiales como tierra, piedras, gravilla o cualquier otro que esté a su alcance.

- ✓ Mantenga **condiciones óptimas de aseo y limpieza** del predio.



- ✓ Realice frecuentemente el **control de plagas** como roedores y moscas.

Fonav
Fondo Nacional Avícola

fenavi

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Fuente: FENAVI - FONAV Programa Técnico

Bioseguridad y prevención ante IAAP

Compartimos piezas gráficas Realizadas por FENAVI - FONAV dentro de la estrategia de prevención para IAAP




MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



- ✓ **Maneje adecuadamente la mortalidad de aves, nunca** arroje la mortalidad a terrenos a cielo abierto, fuentes de agua, ni las utilice para alimentar otros animales, de ser necesario entiérrelas en su predio. El mal manejo de la mortalidad puede atraer gallinazos

- ✓ No olvide realizar el **lavado de manos** antes y después de manipular sus aves.



- ✓ Procure el **uso de vestimenta y calzado exclusivo para el manejo de las aves**, así como la instalación de cajones plásticos con agua y desinfectante al ingreso del lugar donde aloje a sus aves, para desinfectar el calzado.

Notifique de inmediato al ICA, para que profesionales visiten su predio e implementen los protocolos de diagnóstico, **si observa en las aves uno o más signos** como:



- ✓ Decaimiento
- ✓ Plumas erizadas
- ✓ Tos, estornudos, ronquidos, secreción ocular y/o nasal y dificultad respiratoria.
- ✓ Temblores, postración, convulsiones, torsión del cuello o cabeza y parálisis.
- ✓ Inflamación de la cabeza, enrojecimiento o coloración azul en zonas desprovistas de plumas como párpados, barbillas, cresta y patas.
- ✓ Disminución de la producción de huevos o afectación de la calidad de la cáscara.
- ✓ Aumento inexplicable en la mortalidad de aves y/o muerte súbita.




Diríjase a la oficina local
del ICA más cercana,



Ingrese a la página web
www.ica.gov.co o



Comuníquese al
WhatsApp 320 403 08 43



“Juntos podemos contribuir a evitar la propagación de posibles enfermedades con el paso de las aves migratorias. Súmese a esta iniciativa para salvaguardar la sanidad avícola del país”.

Una campaña de:

Fonav
Fondo Nacional Avícola


fenavi

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Fuente: FENAVI – FONAV Programa Técnico

Brotes IAAP en aves de corral en el mundo en enero 2026

Según los recientes reportes OMSA, en el mes de enero se registraron 11 nuevos brotes en aves de corral. Los nuevos casos de IAAP se presentaron en el continente de Asia en Israel e Iraq, además de casos reportados en Europa en Hungría, Reino unido, Ucrania y Polonia.




- Inicio del evento durante periodo de reporte, brote en curso.
- Inicio del evento durante periodo de reporte, brote resuelto.

- Inicio del evento antes del periodo de reporte, brote en curso.
- Inicio del evento antes del periodo de reporte, brote resuelto.

AVES COMERCIALES				
Fecha	País	Tipo Producción	Animales afectados	Subtipo
1/01/2026	Israel	Patos reproductores 41SEM	2000	H5N1
9/01/2026	Iraq	Gallinas ponedoras	60000	H5N1
5/01/2026	Hungría	Pavos de engorde	4800	H5N1
5/01/2026	Hungría	Pavos de engorde	18800	H5N1
12/01/2026	Hungría	Pollos de engorde	17000	H5N1
12/01/2026	Hungría	Gansos reproductores	2050	H5N1
9/01/2026	Hungría	Gansos reproductores	6777	H5N1
16/01/2026	Reino Unido	Patos reproductores	10532	H5N1
5/01/2026	Polonia	Pavos	33357	H5N1
7/01/2026	Polonia	Pavos	35704	H5N1
27/01/2026	Polonia	reproductores de pollos	21011	H5N1
23/01/2026	Ucrania	Traspatio	120	H5N1

Brotes en aves silvestres y mamíferos en el mundo en enero 2026

En aves silvestres y mamíferos se reportaron 15 nuevos brotes en el continente europeo en los países de Suecia, Finlandia, Moldavia, Ucrania, Rumania, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Polonia.



- Inicio del evento durante periodo de reporte, brote en curso.
- Inicio del evento durante periodo de reporte, brote resuelto.
- Inicio del evento antes del periodo de reporte, brote en curso.
- Inicio del evento antes del periodo de reporte, brote resuelto.

Fecha	País	Especie	Animales afectados	Cepa
1/01/2026	Suecia	Branta leucopsis (Barnacla cariblanca)	1	H5N1
12/01/2026	Finlandia	Cygnus olor (Cisne vulgar)	1	H5N1
14/01/2026	Moldavia	Cygnus olor (Cisne vulgar)	2	H5N1
15/01/2026	Ucrania	Cygnus olor (Cisne vulgar)	2	H5N1
16/01/2026	Polonia	Cygnus olor (Cisne vulgar)	1	H5N1
16/01/2026	Rumania	Cygnus olor (Cisne vulgar)	8	H5N1
17/01/2026	Finlandia	Branta leucopsis (Barnacla cariblanca)	1	H5N1
19/01/2026	Finlandia	Barnacla canadiense	2	H5N1
19/01/2026	Finlandia	Barnacla canadiense	1	H5N1
20/01/2026	Moldavia	Cygnus olor (Cisne vulgar)	3	H5N1
21/01/2026	Moldavia	Cygnus olor (Cisne vulgar)	2	H5N1
21/01/2026	Polonia	Ansar Común (Anser anser)	1	H5N1
23/01/2026	Serbia	Cygnus cygnus (Cisne cantor)	1	H5N1
23/01/2026	Polonia	Ansar Común (Anser anser)	2	H5N1
26/01/2026	Bosnia-Herzegovina	Cygnus olor (Cisne vulgar)	1	H5N1

Fuente: OMSA

Situación mundial de la Enfermedad de Newcastle Notificable durante el mes de enero de 2026

Se presentan los nuevos brotes de Enfermedad de Newcastle Notificable en el Mundo durante el mes de enero de 2026



Fecha	País	Tipo Producción	Animales afectados
26/01/2026	Polonia	Gansos reproductores	2100
27/01/2026	Polonia	Pollos de Engorde	19359
19/01/2026	Malasia	Producción de traspatio	135
20/01/2026	España	Pollo de engorde	30000

Fuente: Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación de España, OMSA, UK Government
Fuente: **Animal diseases: international and UK monitoring**

Consulta más información



Los casos registrados en Malasia y España se consideran una reemergencia de la enfermedad en estos países, debido a que se trata de brotes que se detectaron en territorios donde la enfermedad fue controlada previamente y se consideraban libres de la misma. Por su parte, los brotes reportados en Polonia corresponden tanto a la recurrencia en áreas donde la enfermedad había sido erradicada, así como a la primera aparición en una nueva zona del país. De acuerdo con informes oficiales, el comportamiento actual de la enfermedad en el continente europeo alza la preocupación debido a la pérdida de la estabilidad epidemiológica en estas regiones y denota posibles brechas en materia de bioseguridad, vacunación y sistemas de vigilancia epidemiológica, que generan impactos directos sobre el comercio avícola internacional.

La reemergencia de la enfermedad en áreas o países libres, es un ejemplo determinante que el virus es una amenaza activa y de preocupación vigente para la avicultura a nivel global, capaz de reaparecer cuando las medidas de prevención y control se flexibilizan; de tal manera que se deben ejecutar medidas estrictas de bioseguridad y realizando el reporte oportuno a las autoridades sanitarias, acerca de cualquier cuadro respiratorio, neurológico o de alta mortalidad compatible con enfermedades de control oficial y; manteniendo planes de vacunación acorde con la normativa, que se ajusten correctamente a el tipo de producción, asegurando el correcto manejo de las vacunas y aplicando estricta y oportunamente las revacunaciones, que aseguren inmunidad homogénea en los lotes de aves.

La reemergencia de la enfermedad en distintos países confirma que **el virus continúa siendo una amenaza activa y de gran preocupación para la avicultura a nivel global.**

Situación en Colombia de la Enfermedad de Newcastle Notificable

De acuerdo con la resolución ICA N° 103751, "Por la cual se actualizan las medidas sanitarias para el control y erradicación de la enfermedad de Newcastle Notificable en el territorio nacional", es obligatoria la implementación de medidas sanitarias preventivas orientadas a proteger la sanidad aviar, de esta manera la bioseguridad y la vacunación adecuada, son consideradas estrategias esenciales para prevenir la reintroducción y propagación del virus de Newcastle Notificable en el país.

Acorde con el programa nacional de control y erradicación de la enfermedad de Newcastle Notificable en Colombia, la vacunación debe garantizar la protección de todos los sistemas de producción avícola, Utilizando únicamente biológicos aprobados y registrados por el ICA, además, los lineamientos específicos que contemplan los siguientes esquemas:

Esquemas de vacunación según tipo de producción

Aves reproductoras

- **En etapa de levante:** Se deben aplicar como mínimo 3 vacunas vivas y una oleosa
- **En etapa de producción:** Revacunación mínimo cada 10 semanas con una vacuna viva.

Aves de engorde

- Como **mínimo** dos vacunas de las cuales una debe ser viva atenuada y la otra puede ser inactivada, vectorizada o viva atenuada.

Aves de Postura


- **En etapa de levante:** Se deben aplicar como mínimo 3 vacunas vivas y una oleosa
- **En etapa de producción:** Revacunación mínimo cada 10 semanas con una vacuna viva.

Aves de combate

- **En etapa de levante:** Se deben aplicar como mínimo 3 vacunas vivas y una oleosa
- **en la etapa adulta:** Revacunación cada 10 semanas con vacuna viva, en caso de utilizar vacunas oleosas la revacunación se realizará cada 6 meses.

De esta manera, y con el fin de fortalecer la prevención y control de la enfermedad de Newcastle Notificable, el Programa nacional contempla la ejecución de dos ciclos de vacunación al año en zonas de riesgo identificadas por el ICA, que incluyen zonas con antecedentes de la enfermedad, así como zonas fronterizas. Estas acciones se complementan con estrategias de monitoreo y vigilancia epidemiológica, para lo cual se desarrolló un modelo de muestreo que se ejecuta de manera simultánea a las actividades de vacunación.

La implementación continua de medidas de prevención, control y erradicación permitió que en el año 2021 Colombia se autodeclarara como País Libre de ENC Notificable por medio de la Resolución 094488 ante la OMSA. A su vez, estas acciones han posibilitado y garantizado que Colombia mantenga el estatus sanitario como País Libre de la Enfermedad hasta la actualidad.



Dentro de las notificaciones atendidas por parte de ICA no se reportó ningún caso positivo de virus de Newcastle de alta patogenicidad en el país hasta el momento.

Colombia mantiene su estatus de país libre de Enfermedad de Newcastle Notificable

COLOMBIA
País libre de
NEWCASTLE



MINAGRICULTURA



Fuente: ICA



Recuerde la importancia de identificar los casos sospechosos asociados a enfermedades de notificación y reportarlos de manera oportuna en la oficina ICA más cercana, a través de la página **web www.ica.gov.co**.



ICA 
Instituto Colombiano Agropecuario

.....
Salvaguardar la salud de las aves es un compromiso conjunto.

Para más información comuníquese con la línea ICA Nacional **324 238 0738**, con la oficina local del ICA o con el profesional Fenavi - Fonav de su región.



Boletín Sanitario FENAVI

Edición 67

Escríbanos sus comentarios
sobre esta edición al correo

coordinador.sanitario@fenavi.org

Directora Programa Técnico
Diana Sarita Nieto

Con el apoyo de

Hader Díaz Salazar
Coordinador Sanitario

Aida Prada
Coordinadora de inocuidad
en producción primaria y estrategia
de mitigación RAM

**Willian Esteban
Amón Romero**
Pasante Técnico

Programa Técnico

Fonav
Fondo Nacional Avícola



www.fenavi.org